

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL
(Tél.: 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C. C. P., MONTPELLIER 5.238.57

15 francs
N° 44 - MAI 1964
5^e supplément

ARBORICULTURE FRUITIERE

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER (Avertissement)

Certains traitements conseillés par la Station n'ont pu, parfois, être réalisés à temps. C'est pourquoi la maladie s'est installée dans divers vergers (pommier surtout) et elle prend dans ces vergers un caractère alarmant ; la situation peut devenir catastrophique dans les cultures n'ayant pas été minutieusement protégées après notre avis du 8 mai. Dans ces cultures, réaliser un traitement dès réception du présent avis; dans les autres situations il est également nécessaire de renouveler la protection en raison du développement de la végétation. Partout les prochaines pluies peuvent provoquer des repiquages.

Apporter le plus grand soin à l'épandage de la bouillie en respectant les doses de matière active à l'hectare et en ayant soin d'atteindre toutes les parties du feuillage et du fruit.

TORDEUSE ORIENTALE (Avertissement)

Les premières larves sont observées en mineuse d'extrémités des pousses de pêcher.

Commencer la série de traitements sur les abricots et les pêches devant être récoltés entre le 18 et le 30 juin.

PSYLLES (Information)

Diverses plantations de poirier (Garden particulier) sont envahies par les psylles qui émettent un miellat abondant. Avec la multiplication des insectes et le dépôt du miellat sur fruit, la fumagine en se développant dépréciera les fruits.

Traiter et répéter la pulvérisation en employant un produit qui permette d'atteindre également les pucerons.

PUCERONS (Information)

Les pucerons sont actuellement installés sur toutes les cultures arbustives, il faut arrêter ces invasions par l'exécution de traitements renouvelés. Employer, en cas d'échec, des aphicides de composition chimique différente.

RHYNCHITES (Information)

Ces coléoptères sont très actifs provoquant des dégâts sur fruits (morsures). Ajouter un insecticide à la bouillie anti-tavelure.

CARPOCAPSE (Avertissement)

Régions 3, 5, 10, 21, 23 et 24

En montagne les conditions actuelles sont maintenant favorables à l'éclosion et à la reproduction du Carpopapse.

Le traitement devra être effectué avant le 31 mai.

POMMES DE TERRE

DORYPHORE (Information)

Nous rappelons que les traitements anti-doryphoriques les plus efficaces sont ceux dirigés contre les larves ayant atteint la grosseur d'un grain de blé.

L'Inspecteur,
P. BERVILLE

Les Contrôleurs,
L.L. TROUILLON M. BEZUT

Imprimerie de la Station du Languedoc Roussillon. Le Directeur Gérant : L. BOUYX

796

DLP 28-5-64 290271